Par M. Martin. Observation sur une hernie

n.° 95.

Une femme sexagenaire portoit depuis 20 ans une hernie crurale du coté droit; produite par un effort qu'elle avoit fait en soulevant un fardeau. cette hernie rentroit en partie lorsque la malade étoit couchée, ou lorsqu'elle comprimoit la tumeur.

Vers le cinq decembre dernier la hernie augmenta par les efforts d'une toux violente elle ne rentra plus: elle devint douloureuse, il survint des coliques, des vomissements, qui au bout de deux jours étoient de matiere stercorale. On donna a la malade les secours ordinaires tels que les saignées, cataplasmes, lavements; le taxis a été tenté a plusieurs reprises sans aucun succès. tous ces moyens ayant été inutiles; on m'appella le 4.e jour, je trouvai la malade affoiblie et très fatiguées; le pouls étoit petit, frequent, le ventre tendu très douloureux: la tumeur étoit ovalaire, elle avoit trois pouces a peu près de haut en bas et deux en travers.

ARC 15 d. 89

Instruit de tous ce qui avoit precédé; après —
quelques tentatives infructueuses pour reduire
la tumeur; je resus l'operation necessaire, et
j'y determinai la malade.

La peau etoit dans l'etat naturel; il y avoit
peu de serosité dans le sac herniaire qui
etoit un peu epais; il contenoit une portion
d'Epiploon assez considerable, qui etoit très
sain et sans adherences; lorsque developé
il s'est ~~developé~~ trouvé une portion —
d'intestin grêle formant une anse d'environ
trois pouces, placée derriere et au coté intr.
de l'Epiploon; cet intestin etoit libre dans
le sac, il etoit d'une couleur noiratre les
tuniques avoient conservé leur elasticité;
après avoir incisé l'arcade, je le fis rentrer
avec d'autant plus de confiance; qu'ayant
fait avec succès il y a apeuprès deux ans
la même operation à la Salpetriere ou
je trouvai l'intestin beaucoup plus noir que
dans le cas present. la crainte que j'ai alors
qu'il n'arriva crevasse à l'intestin dans l'interieur
me determina apasser une anse de fil dans
le mesentere; je la fixai à l'exterieur de
maniere que l'intestin se trouvoit près de
l'ouverture en cas d'evenement; mais les huit

premiers jours après l'operation s'etant très bien passés; tous les accidents etant parfaitement detruits, j'otai l'anse et la malade guerit en trois semaines apeuprès.

L'intestin dans le sujet de l'observation presente etoit beaucoup moins noir aussy l'ai je reduit avec securité j'ai cependant recommandé à la malade de rester dans une position telle que les viscerès fussent toujours portés du coté de la plaie. L'Epiploon etoit sain et libre, j'etois egalement fondé à le faire rentrer, ce que je fis sans difficulté.

L'operation a été faite le 9 decembre sur les 6. heures du soir. la nuit se passa asses bien, quoique la malade dormit peu, et que le ventre resta tendu et douloureux mais il n'y eut plus de vomissements et le lendemain elle elle fut à la garderobe. le lendemain elle prit un minoratif qui l'evacua copieusement. Le 4.e jour la tension douloureuse du ventre etoit dissipée il n'y avoit plus de fievre; la plaie etoit en bonne suppuration qui se maintint les jours suivants; quelques lambeaux cellulaux se detacherent du fond de la plaie d'où la suppuration paroissoit principalement —

partir : pendant quelques jours il est sortie après qu'en avoit epuisé le pus une liqueur séreuse chargée des quelques goutelettes de graisse surtout quand la malade toussoit ou se mettoit à son séant.

Quinze jours après l'operation, il s'est presenté un lambeau cellulaire au fond de la plaie : monsr. Desault que j'avois prié de donner des soins à la malade a cause de la proximité de sa demeure a tiré ce lambeau et a sa suitte est venue une masse d'Epiploon suppurée qui paroissoit être celle qui avoit été dans la tumeur : il s'est ecoulé immediatement après un demi verre de pus. Les matières stercorales ont sorties le lendemain par la plaie, ce qui à continué pendant huit à dix jours ; la plaie a diminué insensiblement et s'est enfin fermée par une bonne cicatrice. pendant tout ce temps le cours des matières par les voies naturelles n'a pas été interompu il a été favorisé par l'usage de quelques lavements. La malade depuis trois semaines jouit d'une très bonne santé.

Il y a apparence que la constitution que L'Epiploon avoit eprouvée par l'arcade dans le temps de l'etranglement, avoit — interompu le cours des liqueurs, qui n'a pu se retablir dans la portion qui avoit été comprise dans la tumeur; ce qui aura pu donner lieu aux facheux effets de la ligature dont messieurs Louis et Piplet parlent dans l'excelent memoire qu'ils ont donné à ~~l'academie~~ sur cet objet; en effet le pus qui est venu à la suitte semble confirmer ce soupçon.

Cette observation prouve qu'encore que L'Epiploon paroisse sain, qu'il soit libre dans la tumeur, il faut être très circonspect sur le prognostique après sa reduction.

Elle prouve egalement qu'il est très — important que l'intestin quand on le trouve noiratre reste près de l'ouverture après l'avoir fait rentrer on peut l'y retenir avec l'anse comme je l'ai fait dans le premier cas, ou favoriser cette situation par celle du malade, telle que la poitrine soit élevée et le bassin un peu penché du coté de la plaie.

Le 1. fevrier

[signature]